

Rådfråga omedelbart läkare, som då kan uppmärksamma dig att ta Agomelatine Mylan.

- symptom som anges ovan)
  - onormal trötthet (speciellt i samband med andra
  - smärta i övre, högra delen av buken (magen)
  - ljus avföring
  - ovanligt mörk urin
  - gul hud / gula ögon
- Om du observerar något av följande är det möjligt att din lever inte fungerar ordentligt:
- Var uppmärksam på tecken på leverproblem

Tala omedelbart med din läkare om du får veta att dina leverenzymmer i blodet ökar under behandlingen.

**Kom ihåg att ha detta kort med dig på läkarbesök.**

Om din läkare ökar dosen till 50 mg måste samtliga blodprover tas på nytt.

Blod-prover	↑	↑	↑	↑	↑
Före start eller vid dosökning	Efter ca 3 veckor	Efter ca 6 veckor	Efter ca 12 veckor	Efter ca 24 veckor	↑

När?

## TIDER FÖR BLODPROVSTAGNING

### KOM IHÅG

När du tar Agomelatine Mylan är det viktigt att du tar regelbundna blodprov.

Följande tabeller hjälper dig att komma ihåg avtalade tider för blodprovstagning.

Agomelatine Mylan 25 mg – start	Datum
Blodprov för uppföljning av leverenzymmer	
1:a blodprovet (före behandlingsstart)	
2:a blodprovet (efter ca 3 veckor)	
3:e blodprovet (efter ca 6 veckor)	
4:e blodprovet (efter ca 12 veckor)	
5:e blodprovet (efter ca 24 veckor)	

Dosökning till 50 mg	Datum
Samtliga blodprover måste tas på nytt	
Blodprov för uppföljning av leverenzymmer	
Blodprov Agomelatine Mylan 50 mg - start	
2:a blodprovet (efter ca 3 veckor)	
3:e blodprovet (efter ca 6 veckor)	
4:e blodprovet (efter ca 12 veckor)	
5:e blodprovet (efter ca 24 veckor)	

Din läkare bestämmer om ytterligare prov behövs.

**Kom ihåg att ha detta kort med dig på läkarbesök.**

Detta material har utarbetats av Mylan AB

Din läkare kommer att kontrollera med blodprov att din lever fungerar ordentligt innan behandlingen påbörjas. Resultaten kommer att berättas för läkaren hur bra din lever fungerar och om Agomelatine Mylan är lämplig för dig. Under behandlingen med Agomelatine Mylan kan vissa patienter få förhöjda nivåer av leverenzymmer i blodet. Nivåerna av dessa leverenzymmer visar om levern fungerar ordentligt och är ytterst viktiga i uppföljningen av din behandling.

### Vartför?

- Gå regelbundet på blodprovstagning

## För att undvika leverproblem under behandlingen

- Fråga din läkare om råd:
- Om du någon gång har haft leverproblem
- Om du har fetma eller är överviktig
- Om du har diabetes
- Om du dricker alkohol
- Om du tar andra läkemedel (vissa andra mediciner vet man påverkar levern)
- Det kan även finnas andra orsaker till att Agomelatine Mylan inte är lämplig för dig.
- Tala om för din läkare om du har leverproblem: ta inte Agomelatine Mylan om så är fallet.

## Innan du börjar ta Agomelatine Mylan

## Patientkort

# Agomelatine Mylan

Agomelatine Mylan är ett antidepressivt läkemedel som kan användas för att behandla depression.

För att få bäst nytta av ditt läkemedel, följ läkarens anvisningar om hur du ska ta agomelatin (dos, behandlingens längd, uppföljningsbesök, blodprov).

## Rekommendationer för att undvika leverrelaterade biverkningar

Agomelatin kan orsaka biverkningar som kan påverka din leverfunktion.

Den här guiden ger dig vägledning i:

- hur leverrelaterade biverkningar kan undvikas
- vad du ska göra om du får leverrelaterade biverkningar under behandlingen med agomelatin

Fråga din läkare för mer information.

Läs bipacksedeln som finns i agomelatinförpackningen för ytterligare information.

## Rapportering av biverkningar


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)  
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.



Vik på hälften igen



Klipp ut patientkortet enligt markering och vik på hälften



Patientkort  
INSTRUKTIONER

