

Hulio™

adalimumab 40 mg/0.8 ml

Patientkort - för användning till vuxna

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns på www.lakemedelsverket.se



Version 2.0

Senast granskat av Läkemedelsverket 12Dec2019

INNEHAVAREN AV DETTA KORT BEHANDLAS MED HULIO

Detta kort innehåller utvald viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om före och under din behandling med Hulio.

- Ha kortet med dig hela tiden och under 4 månader efter din sista injektion med Hulio.
- Visa detta kort för läkare eller sjukvårdspersonal som du besöker.
- Skriv upp information om tuberkulostest eller -behandlingar som du fått i detta kort.

För utförlig information om Hulio, läs bipacksedeln som finns i Hulio-förpackningen eller tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

1. Inledning

Hulio hjälper patienter med vissa inflammatoriska sjukdomar. Detta sker genom blockering av den del av immunsystemet som hjälper till att bekämpa infektioner.

Hulio kan vara effektivt vid behandling av dessa inflammatoriska sjukdomar, men vissa personer kan få en eller flera biverkningar. Det är viktigt att du talar med läkaren om eventuella fördelar med behandlingen och om biverkningar som kan uppstå när du tar Hulio.

Läs Hulios bipacksedel för en fullständig lista över eventuella biverkningar som du kan få under behandling med Hulio.

2. Före behandling med Hulio

Berätta för läkaren om alla hälsoproblem som du har och alla läkemedel som du redan tar. Detta hjälper dig och läkaren att avgöra om Hulio är rätt för dig.

Tala om för läkaren:

- Om du har en infektion eller symtom på en infektion (såsom feber, sår, trötthetskänsla, tandproblem)
- Om du har eller tidigare har haft tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos
- Om du har eller tidigare har haft cancer
- Om du har domningar eller stickningar eller har något problem som påverkar nervsystemet, såsom multipel skleros.
- Om du nyligen har blivit vaccinerad (typ av vaccination, datum).

Läkaren ska också kontrollera dig med avseende på tecken och symtom på tuberkulos före Hulio sätts in. Du kan behöva behandlas för tuberkulos innan du börjar ta Hulio.

3. Vaccinationer

Hulio påverkar immunförsvaret. Under behandlingen med Hulio kan du vaccinera dig, men inte med vacciner som innehåller levande virus/bakterier.

Om du har fått Hulio under din graviditet, så kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en infektion och får inte ges ett vaccin med levande virus/bakterier (t.ex. BCG-vaccin som används för att förebygga tuberkulos), inom fem månader efter den sista dosen du tog under tiden du var gravid.

4. Under behandling med Hulio

För att säkerställa att Hulio verkar på rätt sätt och är säkert för dig ska du regelbundet besöka läkare för att diskutera hur du mår. Tala genast om för läkaren om det sker förändringar i ditt tillstånd.

Det är viktigt att genast berätta för läkaren om alla ovanliga symtom eller biverkningar som du eventuellt får. Detta hjälper till att säkerställa att du får rätt vård. Det minskar också risken för att biverkningarna förvärras.

Om du får en biverkning kommer läkaren att avgöra om du ska fortsätta eller avbryta behandlingen med Hulio.

Eftersom biverkningar fortfarande kan uppstå efter din sista dos av Hulio, berätta för läkaren om alla symtom som du eventuellt har i upp till 4 månader efter din sista injektion med Hulio.

Berätta för läkaren om:

- Nya sjukdomstillstånd som du utvecklar
- Nya läkemedel som du börjar ta
- Ingrepp eller operationer som är planerade.

5. Biverkningar

Läs Hulios bipacksedel för en fullständig lista över eventuella biverkningar.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Uppsök akut läkarvård om du får något av följande symtom eftersom de kan tyda på en allvarlig biverkning av behandling med Hulio:

- Svåra utslag, nässelutslag eller andra tecken på allergisk reaktion
- Svullet ansikte, svullna händer eller fötter
- Svårt att andas eller svälja
- Blekhet, yrsel, långvarig feber, att man lätt får blåmärken eller blödningar.

Några andra viktiga biverkningar som du kan få innefattar:

- **Infektioner:** Hulo kan göra så att du lättare får infektioner eller förvärra infektioner som du redan har. Detta innefattar infektioner såsom förkylning eller allvarligare infektioner såsom blodförgiftning, opportunistiska infektioner och tuberkulos. Symtom på detta kan vara feber, frossa, kraftig svettning, sjukdomskänsla eller ovanligt kraftig trötthet, illamående eller kräkning, diarré, magsmärta, aptitlöshet eller viktminskning, hosta och blodiga eller slemmiga upphostningar, andfåddhet, urineringssvårigheter, sår, muskelvärk, tandbesvär.
- **Cancer:** Hulo kan öka risken för vissa typer av cancer. Symtom på detta kan vara nattlig svettning, svullnad av lymfknutorna i halsen, armhålorna, ljumskarna eller andra kroppsdelar, viktminskning, nya hudförändringar eller förändringar av födelsemärken eller fräknar som redan finns på huden, svår, oförklarlig klåda.

- **Problem i nervsystemet:** Hudio kan orsaka nya eller förvärrade problem i nervsystemet (demyeliniserande sjukdomar). Symtom som du eventuellt får kan innefatta synförändringar, muskelsvaghet eller oväntad yrsel.

Tala med läkare om du misstänker att du har något av ovan nämnda.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Se bipacksedeln för ytterligare information.

6. Information till dig och sjukvårdspersonal som deltar i din medicinska vård eller behandling

Ditt namn:

Läkarens namn
(förskrivaren av Hudio):

Läkarens telefonnummer:

Indikation:

Datum för din första
injektion med Hudio:

Din dos av Hudio:

Datum för din sista
injektion med Hudio
(om du inte längre tar Hudio):

7. Tuberkulostest och behandling av tuberkulos

Kryssa i rutan om du någon gång har **testats för tuberkulos:**

JA (kontrollera med läkaren om du inte vet)

Kryssa i rutan om du någon gång har **testat positivt för tuberkulos:**

JA (kontrollera med läkaren om du inte vet)

Kryssa i rutan om du någon gång har **tagit läkemedel för att behandla eller förebygga tuberkulos:**

JA (kontrollera med läkaren om du inte vet)

Läs Hulios bipacksedel för ytterligare information. Om du har andra frågor, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Anteckningar (kommentarer eller frågor till läkaren):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....